

Madrid, 15 de septiembre de 2011

Estimado Director:

Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid nos dirigimos a usted para comunicarle que durante el año 2011 ha aumentado el número de casos de sarampión en toda Europa, en España y también en nuestra región. Por ello, queremos aprovechar el inicio del curso escolar para que, en el ámbito del primer ciclo de educación infantil, donde los niños debido a su edad son más susceptibles de padecer dicha enfermedad, se lleven a cabo las oportunas acciones que garanticen la prevención de esta enfermedad.

El sarampión se contagia muy fácilmente desde cuatro días antes del inicio del exantema (erupción cutánea) y lo podemos prevenir de manera muy eficaz mediante la vacunación. Por ello, desde la Consejería de Sanidad queremos recordarle la importancia de que todos los niños que acuden al centro que Vd. dirige estén correctamente vacunados del sarampión, es decir que a partir de los 12 meses tengan puesta una dosis de vacuna triple vírica.

Con el fin de evitar la aparición de casos de sarampión, le rogamos que transmita a las familias del centro la necesidad de revisar su calendario de vacunaciones y acudir al pediatra si el niño ha cumplido 12 meses y no se le ha administrado la vacuna triple vírica. Se adjunta una carta para entregar a los padres de los niños mayores de 12 meses.

Agradeciendo de antemano su segura colaboración, reciba un saludo cordial.

  


Antonio Alemany López

Director General de Atención Primaria

Madrid, 15 de septiembre de 2011

Estimados padres:

Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid nos dirigimos a ustedes para comunicarles que durante el año 2011 ha aumentado el número de casos de sarampión en toda Europa, en España y también en nuestra región. Por ello, queremos aprovechar el inicio del curso escolar para recordarles la importancia que tiene para la prevención de esta enfermedad el que los niños estén vacunados correctamente.

El sarampión es una enfermedad infecciosa muy contagiosa causada por un virus que se transmite por contacto de persona a persona, desde 4 días antes de la aparición del exantema (erupción cutánea) hasta 4 días después, y que podemos prevenir de manera muy eficaz mediante la vacunación.

Por tanto, les pedimos que, para evitar que su hijo adquiera la enfermedad, revise su calendario de vacunaciones y acuda a su enfermero si su hijo ha cumplido 12 meses y no se le ha administrado la vacuna triple vírica.

Agradeciendo su colaboración, reciban un cordial saludo.

  
  
CONSEJERÍA DE SANIDAD  
DIRECCIÓN GENERAL  
DE ATENCIÓN PRIMARIA

Antonio Alemany López

Director General de Atención Primaria